

BIOVISC ORTHO

Гиалуронат натрия 1,0%. Стерильный вискоэластический раствор для внутрисуставного применения.

INSTRUCTIONS FOR USE

СОСТАВ
В явном виде содержатся компоненты:
Гиалуронат натрия 1,0% 10,00mg
Хлорид натрия 8,5mg
Динатрия гидрофосфат дигидрат 0,28mg
Натрия дигидрофосфат моногидрат 0,04mg
Вода по медицинским показаниям

ОСОБЕННОСТИ
BIOVISC ORTHO – стерильный, прозрачный, асептический вискоэластический гель интравеннозного действия с вискоэластическими свойствами. **BIOVISC ORTHO** содержит 10 мг/мл гиалуроновой кислоты в физиологическом растворе, изотоническом по отношению к **BIOVISC ORTHO** состоит из физиологической жидкости для инъекций биомеханического происхождения.

ПОКАЗАНИЯ
BIOVISC ORTHO это являющаяся гиалуроновая кислота для лечения остеоартрита коленного, тазобедренного и плечевого суставов, обеспечивающая функцию суставов.

BIOVISC ORTHO предназначен для введения больным и дискомфорта в коленных суставах у пациентов с остеоартритом легкой или средней степени.

ДОЗИРОВКА
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
BIOVISC ORTHO нельзя вводить пациентам с чувствительностью к любому из компонентов. Не вводить **BIOVISC ORTHO** в коленный сустав, если у пациента есть кожные заболевания или нарушения целостности кожных покровов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ВНИМАНИЕ
Не применять **BIOVISC ORTHO** для инъекций в коленный сустав, если у пациента есть кожные заболевания или нарушения целостности кожных покровов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
BIOVISC ORTHO предназначен для системного лечения, включающего 3-5 инъекций, с тем, чтобы не было никаких побочных эффектов и не было никаких побочных эффектов. Пациент должен быть информирован о том, что инъекция должна быть сделана в течение 6-8 недель, если пациент имеет сустав, который не был ранее введен.

BIOVISC ORTHO

Гиалуронат натрия 1,0%. Стерильный вискоэластический раствор для внутрисуставного применения.

INSTRUCCIONES DE USO

COMPOSICIÓN
En claro contiene:
Hidrolato de sodio 10,00mg
Cloruro de sodio 8,5mg
Dihidrogeno Fosfato Dihidratado 0,28mg
Monohidrogeno Fosfato Monohidratado 0,04mg
Agua para inyección q.s.

DESCRIPCIÓN
BIOVISC ORTHO es un gel viscoelástico estéril, transparente y homogéneo de ácido hialurónico de alto peso molecular. **BIOVISC ORTHO** contiene 10 mg/ml de ácido hialurónico en solución fisiológica.

INDICACIONES
BIOVISC ORTHO es un suplemento de ácido hialurónico para el tratamiento de la osteoartritis leve a moderada, al proporcionar lubricación conjunta y mejorar la movilidad de la articulación.

POSOLÓGIA
BIOVISC ORTHO está pensado para 3-5 tratamientos de inyección, es necesario que el paciente sea informado de que la inyección debe ser hecha en un intervalo de 6-8 semanas.

CONTRAINDICACIONES
BIOVISC ORTHO no se debe inyectar, si se sabe que el paciente es alérgico a cualquiera de los componentes.

ADVERTENCIAS
No preparar la solución con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario, otros el cloruro de benzalconio, que puede irritar la prescripción de HA.

PRECAUCIONES
General
La seguridad y eficacia de **BIOVISC ORTHO** para condiciones distintas de osteoartritis de la rodilla no ha sido establecida científicamente.

Información para el Paciente
Proporcione a los pacientes una copia de la etiqueta del paciente antes de su uso. Informar a los pacientes de que la inyección debe ser hecha en un intervalo de 6-8 semanas.

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

REACCIONES ADVERSAS
No se informó de reacciones adversas específicas durante el uso de **BIOVISC ORTHO**. Sin embargo, se han reportado reacciones adversas que incluyen:

BIOVISC ORTHO

Sodium Hyaluronate 1.0%. Sterile viscoelastic solution for intra-articular use.

KULLANIM KILAVUZU

BİLEŞİM
Her ml içerir:
Sodyum Hyaluronat 10,00mg
Sodyum Klorür 8,5mg
Dihidrojen Fosfat Dihidrat 0,28mg
Sodyum Dihidrojen Fosfat Monohidrat 0,04mg
İnjektan için Su q.s.

AKILLAMA
BIOVISC ORTHO jelimsi, şeffaflıktır, homojen ve viskoelastik bir jel. Yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit içerir. **BIOVISC ORTHO** 10 mg/ml hyaluronik asit içerir.

ENDİKASYONLAR
BIOVISC ORTHO eklem yığılma engellemek, half-orta jidde osteoartrit tedavisinde yardımcı olabilir. **BIOVISC ORTHO** 10 mg/ml hyaluronik asit içerir.

KONTRENDİKASYONLAR
BIOVISC ORTHO kullanılmamalıdır. Eğer hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Kullanmadan önce, hasta, herhangi bir alerjiye karşı duyarlıysa, **BIOVISC ORTHO** kullanılmamalıdır.

BIOVISC ORTHO

Sodium Hyaluronate 1.0%. Sterile viscoelastic solution for intra-articular use.

POKYNY NA UŽÍVANIE

ZLOŽENIE
Každý ml obsahuje:
Sódium Hyaluronát 10,00mg
Sódium Chlorid 8,5mg
Dihydrogén Fosfát Dihydrát 0,28mg
Sódium Dihydrogén Fosfát Monohydrát 0,04mg
Voda pre injekciu q.s.

POPUŠT
BIOVISC ORTHO je sterilný, priehľadný, homogénny viskoelastický gel s vysokou molekulovou hmotnosťou kyseliny hyaluronovej. **BIOVISC ORTHO** obsahuje 10 mg/ml kyseliny hyaluronovej v fyziologickom roztoku.

INDIKÁCIE
BIOVISC ORTHO je doplnkom krvného výživu s kyselinou hyaluronovou, ktorá v chrbtici a kolennom kĺbe má význam osteoartritu. **BIOVISC ORTHO** je indikovaný u pacientov s osteoartritou kolenného kĺbu.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

KONTROINDIKÁCIE
BIOVISC ORTHO sa nemá používať, ak má pacient alergiu na ktorúkoľvek zložku lieku.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

POKYNY NA UŽÍVANIE
BIOVISC ORTHO sa má užívať v režime 3-5 injekcií, s tým, aby medzi injekciami bolo 6-8 týždňov.

BIOVISC ORTHO

Sodium Hyaluronate 1.0%. Sterile viscoelastic solution for intra-articular use.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÖSSZETÉTEL
Egy ml tartalmá:
Nátrium-Hialuronát EP 10,00mg
Nátrium-klorid 8,5mg
Dihidrogén-Foszfát-Dihidrát 0,28mg
Nátrium-Dihidrogén-Foszfát-Monohidrát 0,04mg
Víz a befecskendezésre q.s.

LEHETŐSÉGEK
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIOVISC ORTHO a szteroidok, hormonok, vitaminok, ásványi anyagok, szerves és szervetlen anyagok, valamint a kalcium és a foszfor forrása.

HASZNÁLAT
BIO