

Abilar® 10 % Pryskyřicová mast

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod k použití. Mast se používá zevně k lokálnímu ošetření.

Co je obsaženo v tomto návodu k použití

- Co je to pryskyřicová mast Abilar® 10% a k čemu se používá
- Návod k použití přípravku Abilar® 10% pryskyřicová mast
- Účinná látka
- Další složky
- Skladování a stabilita
- Možné nežádoucí účinky
- Další informace

Účel použití:

Účinnost přípravku Abilar® 10% pryskyřicové masti je založena na účincích pryskyřice smrku ztepilého (*Picea abies*). Abilar® 10% pryskyřicová mast se používá k lokálnímu ošetření infikovaných i neinfikovaných ran, a to v domácím i profesionálním použití. Rány mohou být akutní nebo chronické; například tržná rána, odřenina, fisura, popálenina, tlakový vřed, diabetický vřed, komplikace chirurgické rány nebo otevřený absces.

Surová pryskyřice v přípravku Abilar® 10% pryskyřicová mast je čištěna pomocí purifikační metody patentované společností Repolar Pharmaceuticals Oy. Složení, čistota a biologická a antimikrobiální účinnost masti se stanovuje z každé výrobní šarže. Systém kvality společnosti Repolar Pharmaceuticals Oy je certifikován podle normy ISO 13485:2016.

Návod k použití pryskyřicové masti Abilar® 10%:

Očistěte tržnou ránu, odřeninu nebo poranění a osušte je. Jednou až dvakrát denně naneste přímo na postižené místo mast Abilar® 10 %.

V případě potřeby lze postižené místo chránit prodyšným obvazem nebo náplastí. Při ošetřování ranných dutin nebo otevřených abscesů postupujte podle pokynů zdravotní sestry nebo lékaře pro ošetřování ran. Prskyřicová mast Abilar® 10% vytváří na povrchu rány ochrannou vrstvu, která zlepšuje hojení. Vyhněte se aplikaci masti do očí nebo úst.

Účinná látka: Prskyřice smrku ztepilého (Picea abies).

Další složky: Cera microcristallina, sorbitan oleát, Cera alba, hydrogenovaný ricinový olej, kyselina stearová.

Skladování a stabilita: Po otevření zůstane stabilní při pokojové teplotě po dobu 1 roku a neotevřená minimálně 5 let.



= Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Těhotenství a kojení: Neexistují žádné údaje ze studií o možných nežádoucích účincích během těhotenství a kojení.

Interakce: Nejsou známy žádné klinicky významné interakce.

Vliv na schopnost řídit: Neovlivňuje schopnost řídit a používat stroje.

Nežádoucí účinky: Možným nežádoucím účinkem je alergická reakce způsobená prskyřičnými sloučeninami smrkové prskyřice, která se projevuje lokálním podrážděním kůže v ošetřované oblasti. Pokud se objeví alergické kožní reakce, je

třeba používání pryskyřičné masti přerušit. Jakékoli nežádoucí účinky, interakce apod. nahlaste výrobci.

Výrobce:

Repolar Pharmaceuticals Oy

Suomalaistentie 7

FI-02270 Espoo, Finland

www.repolar.com

info@repolar.com

Tel.: +358 40 7171 761

CE 0537

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

11/2019