

HU

Javallatok:

Műtét vagy sérülés után használatra, amikor szükség lehet a térd hajlításának és nyújtásának szabályozására, így például az oldalsó vagy középső ízületi izmagsérült érintett beavatkozások esetében. Műtét előtti immobilizációhoz is ajánlott.

Övintézkedések:

- Az ortézis használatát elől figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolta.
- Az ortézis felírására az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is ő dönt.
- Használat előtt az ortézis összezeresését és beállítását szakembernek kell végeznie. A páciénshoz való alaktás után az ortézis beállítását csak képzett szakember módosíthatja.
- Bár az ortézis nem egyetári használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseken használni nem szabad.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőorvosa külön utasításait.
- Az eszköz használatra szakember által rendszeres felvilágosítást igényel.
- Ha bármilyen mellékhatás észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- A kezelőorvos tájékoztatja, ha a páciens börtüntézet észlel vagy valamilyen érzékenység lép fel.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használatá mellett.
- Higiéniai és kényelmi okokból az ortézis alá lehetőleg varrat nélküli pamut ruha viselése ajánlott.
- A nyomással történő támasztás területén a bőr nem lehet sérült, sem túlerőszak.
- Az ortézis megfelelő használatá függ az alkotóelemeknél állapotától ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az eszközzel.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiénára.
- A páciens kezeléssel nyomom követő egészségügyi dolgozó a páciens részére jelezheti a termék alkalmasságát vagy javaslhatja annak lecserélését, ha a termék megrongálódott vagy elkopott.
- Fürdéshez, zuhanyzáshoz, stb. vegye le az ortézist.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a pántok feszesek és megfelelő állapotban vannak (zsir-, vágás- és szakadásmentesek). A zárókésség megőrzése érdekében ajánlott ügyelni a tépőzár gyors záróelemének tisztaságára, és a tépőzárhoz tartozó szálakat bolyhosítá stb. elcsúszást elhárítani.

A két oldalon található csuklós elemek maximális hajlítását és nyújtását is be kell állítani. Az ortézis csak akkor használható, ha a zároelemek megfelelően vannak elhelyezve. Haszonképpen a teleszkopos mechanizmust is mindkét oldalon be kell állítani és megfelelően kell rögzíteni. Annymivel az ortézis bármelyik záróelemének nem működik megfelelően, forduljon azonnal az ortopédiai technikushoz vagy ahhoz a létesítményhez, ahol az ortézist vásárolta.

Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:

Hossz (teleszkopos eszköz):

A. Lazítsa meg az összes pántot, és helyezze a csuklós elem középső részét a térd középre. Az ortézis pántjainak hosszát úgy állítsa be, hogy a pántokat a csatok lenyomásával kiengei és kihúzza vagy visszahúzza, amíg a megfelelő hosszúságot el nem éri.

B. Zárja be a csatokat, és húzza ki a pántok végét a B. ábrán feltüntetett szempontnak megfelelően. A felesleges pántösszetét le kell venni; az ortézis kialakítása lehetővé teszi a pánt végének rögzítését úgy, hogy ez ne legyen útban.

A hajlítás-nyújtás korlátozása (csuklós elem):

C. A csuklós elem 0°, 15° és 30°-os kiengeedéséhez nyomja meg a két színt csatot az „UNLOCK” felirat irányába, rögzítéséhez pedig a „LOCK” felirat irányába. Ha az ortézist a 0°-ra szeretnő rögzíteni.

D. Helyezze a hajlítás-nyújtást beállító elemeket a szükséges helyre (nyújtás/hajlítás), az ortézis felíró orvos által meghatározott szögben.

E. A pántok meglazításához húzza meg a csatot az E ábrán látható irányba. Miután a fű kizsabadott a tartójárból, a csat kilazul.

A termék karbantartása – Mossa utasítások:

*Az ortézis textil részei mosáshoz könnyen eltávolíthatók. Kézzel mossa. Hypót ne használjon. Szárítógépben ne szárítsa. Ne vasalja. Kerülje a vegytisztítást.

Megjegyzés: A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságnak abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/ vagy a páciens él.

NL

Indicaties:

Postoperatieve of posttraumatische behandeling waarbij de flexie/extensie van de knie niet worden belemmerd, bijvoorbeeld na operatie van de laterale of kruisbanden. Ook geschikt voor preoperatieve immobilisatie.

Waarschuwingen:

- Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij vragen uw arts of de winkel waar u het product gekocht hebt.
- De zorgverlener dient een persoon te zijn die bevoegd is om een behandeling te bepalen en voor te schrijven.
- De orthese moet vooraf door een gekwalificeerd persoon worden gemonteerd en ingesteld. Nadat de orthese aan een specifieke patiënt is aangepast, mag hij niet meer worden aangepast, tenzij door gekwalificeerd personeel.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt.
- Bij de orthese moet u op andere patiënten.
- Volg altijd de algemene gebruiksinstructies en de instructies van uw zorgverlener.
- De zorgverlener dient regelmatig het gebruik van de orthese op te volgen.
- Als u een navenenwringt opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.
- De zorgverlener moet op de hoogte worden gesteld van mogelijke huidaanrakingen of tekenen van gevoeligheid bij de patiënt.
- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- Om hygiënische en praktische redenen, is het raadzaam een katoenen kledingsstuk, liefst zonder naden, onder de orthese te dragen.
- In de zones waar de orthese op de huid drukt, mag de huid geen wonden vertonen of hypergevoelig zijn.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen; controleer ze daarom regelmatig.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.
- Maak regelmatig de orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Wanneer de orthese versleten of in slechte toestand is, zal de zorgverlener de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.

Verwijder de orthese voordat u een bad of douche neemt.
Controleer regelmatig of de riemen correct gespannen zijn.
Als er een lang stuk niet overblijft, knip dit weg. Het overblijvende deel af dankzij het velcrobandstelsysteem kan het uiteinde van de riem worden vastgezet zodat het niet stooft.

De beweging van de gewrichten moet aan beide kanten gelijk worden ingesteld. Gebruik de orthese uitsluitend wanneer de vergrendelingen correct ingesteld zijn. Ook het telescopische mechanisme moet aan beide kanten gelijk zijn ingesteld en correct vergrendeld zijn. Als een van de vergrendelingen niet meer correct werkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw orthopedisch technicus of uw handelaar.

Instructies voor een correcte plaatsing:

Lengte (telescoop-mechanisme):

A. Maak alle riemen los en plaats de middelste as van het gewricht op de as van de knie. Om de lengte van de riemen van de orthese in te stellen, houdt u de vergrendelingen van de gespen ingedrukt om ze te openen en trekt u de riemen aan of los tot dat u de juiste lengte bereikt.

B. Sluit de gespen en trek aan de uiteinden van de riemen, zoals weergegeven in afbeelding B. Als er een lang stuk niet overblijft, knip dit weg. Het overblijvende deel af dankzij het velcrobandstelsysteem kan het uiteinde van de riem worden vastgezet zodat het niet stooft.

De flexie/extensie-beweging beperken (gewicht):

C. Druk het blauwe lipje in de stand “UNLOCK” om het gewricht in de stand 0°, 15° en 30° te zetten, en zet het lipje in de stand “LOCK” om het gewricht te vast te zetten.

D. De gewrichten moeten aan beide kanten gelijk zijn ingesteld en correct vergrendeld zijn.

D. Plaats de pinnen in de gewenste stand (extensie/flexie) naargelang de door de arts vastgelegde hoek.

E. Om de riemen los te maken dient u aan de gesp te trekken naar de richting die op afbeelding E wordt aangegeven. Zodra het flapje uit de voering komt, is de gesp los.

Onderhoud van het product – Wasinstructies:

Maak de stijve oppervlakken schoon met een vochtig doek.

*Het textiel van de orthese kan gemakkelijk worden verwijderd en gewassen. Met de hand wassen. Geef bleekwater gebruiken. Niet drogen in trommelrooier. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.

Opmerking: Ernstige bijzonderheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker y/of patiënt verblijft.

PL

Wskazania:

Leczenie pooperacyjne lub pourazowe stawu kolanowego, wymagające ewentualnej regulacji długości i wyprostu (np. w przypadku zabiegów więzadła pobocznych lub krzyżowych). Ortez zalecana jest także w przypadku konieczności unieruchomienia pooperacyjnego.

Zalecenia:

- Przy wystąpieniu do jej użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym nabyto produkt.
- Decyzję w sprawie leczenia i czasu stosowania ortezę podejmuje lekarz.
- Wymagane jest, aby wykwalifikowany personel dokonał uprzedniego montażu ortezy i jej dopasowania. Po doposażeniu, nieopuszczalna jest jakkolwiek samodzielna regulacja ortezy przez osoby nieposiadające specjalistycznych kwalifikacji.
- Jest ona przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby i nie powinna być ponownie stosowana w odniesieniu do innych pacjentów.
- Wskazania lekarza specjalisty oraz ogólne zalecenia dotyczące ortezy i jej użytkowania powinny być zawsze przestrzegane.
- Leczenie powinno być regularnie kontrolowane przez lekarza prowadzącego.
- W przypadku pojawienia się skutków ubocznych, należy zgłosić je lekarzowi.
- Powinien on być także informowany o wystąpieniu zmian skórnych i wszelkiego rodzaju uczulenich.
- Istotne jest wykluczenie przez lekarza możliwości używania kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego podczas korzystania z ortezy.
- Ze względu na higienę i wygodę użytkowania, zaleca się noszenie pod ortezą bawełnianych tkanin, jeżeli to możliwe - bez szwów.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadrażniona w miejscach podparcia narazonych na nacisk.
- Należy systematycznie sprawdzać, w jakim stanie znajdują się wchodzące w skład ortezy elementy, od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie.
- Nie należy pozwalać, aby bawiły się nią dzieci.
- Należy regularnie czyścić ortezę i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Kontrolujący postępy leczenia personel medyczny może poinformować pacjenta, że stosowanie przez niego produktu nadaje się do użytku lub wskazać jest jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ortezy podczas kąpieeli, pod prysznicem, itp.
- Należy regularnie kontrolować prawidłowe napięcie poszczególnych taśm (zonder vet, schurenen, rafels etc). Om de Kleeftkracht van het klittenband in de brak zatuscheren, nacięć, rozdarć, itp.). Zalecane jest także utrzymywanie zapieć na rezy Velcro w należytej czystości, zapewniając ich odpowiednią przyczepność (usuwanie z nich wszelkiego rodzaju nitki, kłapienia, itp.).
- Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.
Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.
Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.
Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:

Regulacja długości (mechanizm teleskopowy):

A. Rozpiąć wszystkie paski i ustawić ortezę w stosunku do stawu kolanowego w taki sposób, aby ich ośie poprzeczne przekrwały się ze sobą. Aby wyregulować długość pasków, uwolnić zaczepek klamry każdego z nich, wskazując odpowiedni przycisk. Następnie wydłużyć lub skrócić paski aż do uzyskania wymaganej długości.

B. Zapiąć klamry oraz pocinając za końce pasków i zamocować je w kolejności ukazanej na rysunku B. Aby otworzyć klamrę, należy nacisnąć przycisk. Koncówka typu krokodyl umożliwia przymocowanie końca każdego paska w taki sposób, aby nam nie przeszkadzał.

Ograniczenie zgłęcia-wyprostu (mechanizm przegubowy):

A. Odłożyć ortezę na płaską powierzchnię, przesuwać przegłbek w pozycji „UNLOCK”, i ustawić 0°, 15° lub 30°, a następnie ponownie go zablokować „LOCK”. Regulację tę przeprowadzamy na specjalne zlecenie lekarza.

D. Dokonać odpowiedniego ustawienia wskaźników (wyprost/zgięcie) zgodnie z podanymi przez lekarza zaleceniami wskazaniami kątowymi.

E. W celu rozpoczęcia taśm dociągających, należy podciągnąć za klamrę w kierunku wskazanym na rysunku E. Po uwolnieniu zatrzasku z gniazda, następuje otwarcie klamry.

Pielęgnacja ortezy - zalecenia dotyczące czyszczenia:

Tłyszmye powierzchnie należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki.

*Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.
Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortezę nie można wyregulować, należy zgłosić to lekarzowi.

Pracownicy medyczni nie powinni przegubiwać się ze sobą. Aby wyregulować długość ortezy, należy użyć odpowiednich narzędzi.

Jeżeli ortez