

Od: [Zogala David, doc. MUDr. Ph.D.](#)
Komu: [Vysekalová Eva](#)
Kopie: [Havel Martin](#)
Predmet: Indikace PSMA PET s ohledem na posouzení vhodnosti radioligandové terapie
Datum: úterý 21. cervence 2026 15:21:36
Prílohy: [Indikace LuPSMA PET.pdf](#)

Tento e-mail nepochází z Vaší organizace. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy, pokud neznáte odesílatele a nevíte, zda je obsah bezpečný.

Vážená paní Vysekalová,

dovoluji se na vás za CSNM obrátit s následujícími podnety zaměřenými na kultivaci situace s PSMA PET radiofarmaky v OOP.

1. Doporujeme vyradit ze sekce omezení „P“ přípravek ^{68}Ga -PSMA-11 (. V seznamu IPLP již není příslušný kód, jednalo se o úhradu vázanou na dřívější SLP, nyní se používá a vykazuje IPLP 2016, tedy ^{68}Ga -gozetotid. Jedná se principiálně o stejný přípravek. Položka v seznamu omezení je nadbytečná, patrne nebyla odmazána s odstraněním příslušného kódu.
2. Příkladám odborné stanovisko CSNM, na základě kterého bychom doporučovali sjednotit také omezení pro ^{68}Ga -gozetotid a ^{18}F -PSMA. Pro indikaci cílené terapie (rozumí se aktuálně ^{177}Lu -PSMA) je z odborného hlediska možné použít jakýkoliv kit, ze kterého je připraven ^{68}Ga -gozetotid i ^{18}F -PSMA. I ostatní indikace ^{68}Ga -gozetotidu a ^{18}F -PSMA se kryjí, považovali bychom za vhodné, aby si i omezení P vzájemně odpovídala. Příslušný odstavec terapeutického radiofarmaka také mluví obecně o vyšetření „PSMA-ligandem“.

Navrhujeme tedy úpravu omezení ^{18}F -PSMA podle přípravku ^{68}Ga -gozetotid, tak aby výsledný text znel:

Individuálne pripravované radiofarmakum určené pro diagnostiku pouze na specializovaných pracovištích nukleární medicíny pomocí PET, PET/CT, resp. PET/MR skeneru je hrazeno v následujících klinických stavech:

- *Primární staging u pacientu s vysoce rizikovým karcinomem prostaty před primární kurativní terapií.* "
- *Podezření na recidivu karcinomu prostaty u pacientu se zvyšující se hladinou prostatického specifického antigenu (PSA, prostate-specific antigen) v séru po primární kurativní terapii.*
- *Identifikace pacientu s PSMA pozitivním progresivním metastazujícím kastracne rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC, metastatic castration-resistant prostate cancer), pro které je indikována cílená terapie PSMA.*

Dekuji a jsme dále k dispozici.

S pozdravem

D. Zogala